

medio de evolución en el adulto, que no son muchos sino pocos los quistes del adulto que remontan a la infancia o a la primera juventud.

13. Consideramos necesario reunir un gran número de observaciones, en que pueda precisarse aproximadamente el origen del quiste y con certeza sus características anatomo-patológicas, para esclarecer más completamente este interesante problema.

(Ext. de los "Anales de la Facultad de Medicina", de Montevideo).

#### NUEVO REGLAMENTO PARA CUARENTENAS EN NUEVA YORK.

En una reunión reciente del Departamento de Sanidad se adoptaron las siguientes reglas para el *aislamiento de personas atacadas de enfermedades contagiosas*:

Para la aplicación de este reglamento, el periodo mínimo de cuarentena será como sigue:

- a) *Difteria*: Doce días desde el principio del ataque.
- b) *Escarlatina*: Treinta días desde la aparición de los primeros síntomas.
- c) *Meningitis cerebroespinal epidémica*: Catorce días desde el primer ataque.
- d) *Poliomielitis anterior aguda*: Tres semanas desde su comienzo.
- e) *Fiebre tifoidea*: Hasta diez días después que la temperatura del paciente llegue a la normal.

(Journal A. M. A. E. E.)

#### LA EVOLUCIÓN DE LOS ESPIROQUETOS DE LA FIEBRE RECURRENTE EN EL PIOJO.

Ch. Nicolle y Ch. Lebailly, han dado a conocer el resultado de sus investigaciones relativas a la evolución de los expresados parásitos, tal como es posible seguirlos por medio de cortes en serie de estos insectos. Según dichos observadores, los piojos alimentados sobre un enfermo atacado de fiebre recurrente, absorberían con la sangre numerosos espiroquetos y éstos sufrirían primeramente una evolución en el interior de